

Alimentation des NAC à écailles

NOM COMMUN	NOM SCIENTIFIQUE	MODE DE VIE	TAILLE/ POIDS ADULTE	TEMPERATURE (°C) DIURNE/ NOCTURNE	RÉGIME ALIMENTAIRE
Python Royal	<i>Python regius</i>	terrestre	1m30/1.2 kg	25-35/ 21-25	Carnivore
Boa constrictor	<i>Boa constrictor</i>	Semi-arboricole	3m50/20 kg	26-32/ 24-27	Carnivore
Python molure	<i>Python molurus</i>	terrestre	5m/60 kg	27-32/ 21-27	Carnivore
Python réticulé	<i>Python reticulatus</i>	terrestre	6m/80 kg	25-32/ 21-25	Carnivore
Python vert	<i>Morelia viridis</i>	arboricole	1m20 à 2m 1kg	26-30/ 21-25	Carnivore
Iguane vert	<i>Iguana iguana</i>	arboricole	1m80/3.5 kg	28-34/ 19-25	Herbivore
Agame barbu	<i>Pogona vitticeps</i>	terrestre	50cm/300 g	28-35/ 20-23	Carnivore, insectivore et herbivore
Gecko léopard	<i>Eublepharis macularius</i>	terrestre	25 cm/80g	25-29/ 19-25	Insectivore
Tortue d'hermann	<i>Testudo hermanni</i>	terrestre	22 cm/2.5kg	24-30/ 15-21	Herbivore strict
Tortue grecque	<i>Testudo graeca</i>	terrestre	30cm/4.5 kg	24-32/ 18-21	Herbivore strict
Trachémyde	<i>Trachemys</i>	aquatique	20cm/2kg	24-26/ 18-21	Carnivore et herbivore

Pythons, Boas

Carnivores, ils se nourrissent de proies vertébrées (rongeurs, oisillons, lapins, oiseaux) qui constituent un menu complet et équilibré. Ces proies doivent être distribuées entières avec leurs os et leurs viscères en moyenne une fois par semaine. Les proies sont distribuées mortes fraîchement sacrifiées ou décongelées pour éviter les morsures.

Iguane vert

Herbivore strict il se nourrit de végétaux et fruits en libre service (feuilles de pissenlit,

cresson, mâche, chicorée frisée, figues, kiwi, oranges, papayes), granulés complets à base de luzerne.

Agame barbu

Il se nourrit d'insectes (en libre service), rongeurs (souriceaux de 1 jours 1 à 3 fois par semaine), végétaux (luzerne, mangue, papaye, cresson, persil, pissenlit). Les granulés spécifiques sont pratiques pour éviter les végétaux frais tous les jours mais peuvent prédisposer l'agame à la déshydratation.

On conseille de distribuer le repas une fois tous les deux jours, en fin de matinée, quand le lézard a accumulé assez de chaleur pour digérer correctement.

Il convient de saupoudrer les insectes de poudre de carbonate de calcium avant les repas.

Avec l'âge, il convient de diminuer l'apport d'insectes tout en augmentant la part de végétaux pour atteindre un régime strictement herbivore au-delà de 4 ans d'âge.

Gecko léopard

Il convient de lui apporter une fois par jour, de préférence à la tombée de la nuit pour respecter ses mœurs nocturnes, quelques insectes (grillons, criquets, sauterelles, teignes de ruches, papillons, mouches, vers de farine tous saupoudrés préalablement de poudre de carbonate de calcium.

On laissera en permanence à

disposition dans le terrarium une coupelle contenant de l'os de seiche en poudre, à volonté.

Tortue d'Hermann et Tortue grecque

Voir "Alimentation Tortues"

Trachémyde

Elle se nourrit de poissons frais entiers, lombrics, crevettes fraîches, fruits de mer, souriceaux, végétaux aquatiques (jacinthes, sagittaires), granulés spécifiques.

Il convient de nourrir les juvéniles 1fois/jour et les adultes 1 fois tous les 2 jours.

Il faut proscrire les régimes «tout viande» carencés en calcium et les crevettes séchées.

Sites internet conseillés:

<http://www.docteur-boussarie.com/articles-veterinaire/90-reptiles/>

<http://theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=881>